

◎発作時の対応◎

※緊急連絡先にいつTELするかは各々記入

※発作開始 AM・PM 時 分

※発熱 有( )℃・無

座薬対応 : 先生  
 様子観察 : 先生  
 救急車要請: 先生



全身けいれん  
ピク (間代発作)

体の突っ張り  
ピーン (強直発作)

ピク (強直間代発作)


右・左・左右対称  
 チアノーゼあり

- ・体を横にして顔を横に向ける
- ・唾液や吐瀉物を拭く
- ・口の中に物や指を入れない
- ・揺すったり叩いたり大声で呼ばない

反応がない  
顔色が悪い  
唇や爪が青紫色  
呼吸が不安定 (複雑部分発作)

ボー

右・左・上 眼球偏位  
 チアノーゼあり



※発作終了 \_\_\_\_時 \_\_\_\_分

様子をみる\*

坐薬等挿入 ( \_\_\_\_時 \_\_\_\_分)

※ 発熱等で既に同じ坐薬を挿入済みの場合は不要

坐薬 \_\_\_\_ mg・cc 使用

※発作終了 \_\_\_\_時 \_\_\_\_分

様子をみる\*

挿入 \_\_\_\_分後 以降

発作が続く  
又は  
発作を繰り返す

※発作終了 \_\_\_\_時 \_\_\_\_分

様子をみる\*

「119」 救急要請・救急搬送

※病院到着後、使用した薬剤を医師に伝える

救急搬送先病院

病院名: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_

- 【一緒に持っていく物】
- ・靴、着替え
  - ・かばん
  - ・
  - ・
  - ・

- \* 様子をみる場合
- ・眠ったらそのまま寝かせる
  - ・嘔吐することがあるので顔は横向きに
  - ・もうろうとして歩き回る時は軽く寄り添う
- ※発作後に水や薬を飲ませない

