

◎ 発作時の対応 ◎

- 酸素
- 吸引
- その他

◎ 発作について ◎

- 強直発作**: 全身に力が入り、突っ張り、身体が固くなる発作。

チアノーゼを伴うことがある。

頻度や発作を起こす状況、発作時注意事項など



- 間代発作**: 全身、もしくは身体の一部が、ピクピクがくがくする発作。

チアノーゼを伴うことがある。



- 強直間代発作**: 全身を突っ張り、がくがくする発作。

チアノーゼを伴うことがある。



- 非定型欠神発作**: 意識を失いぼーっとする。話しかけても反応しない発作。目をパチパチする。



- ミオクローニー発作**: 全身、あるいは手足の一部が一瞬ピクツとする発作



- 複雑部分発作**: 反応が低下し、顔色が悪くなったり、眼球が左右どちらかに寄ったり、身体の一部が無意識に動いたりする発作



◎ 入院時の注意事項 ◎

- 発熱**で発作を誘発 解熱剤使用有無やクーリング方法など

※発熱時の対応

- 暑さや温度差**で発作を誘発

汗をかけないので体温調整が出来ない。お風呂の湯温は低めにし入浴は短く。

※室温やクール対策について

- 睡眠不足**で発作を誘発

※お昼寝中の対応

※夜間就眠中の対応

- 光過敏**(光で発作を誘発)あり

- 模様過敏**(模様で発作を誘発)あり

◎ その他 ◎