

ド ラ ベ

Dravet症候群

(乳児重症ミオクロニーてんかん:SMEI)

フリガナ

名前 _____

歳

**活動・発作時対応マニュアル****個人情報**

年 月 日生 (男・女) 体重 _____ Kg

住 所:

自宅番号:

保 護 者:

保護者携帯電話番号_____

病 名: ド ラ ベ 症候群

搬送先病院:

主治医 _____ Dr.



診察券番号:

症 状: 全身性のけいれん・非けいれん性てんかん発作・重積傾向あり

手帳・等級:

※救急隊の方へ:重積傾向があるため一刻を争います!早急な救急車の発車をお願いします!

**緊急連絡先**

| | 氏名 | 続柄 | 電話番号 | メールアドレス |
|---|----|----|-----------|---------|
| ① | | | (自宅・携帯・) | |
| ② | | | (自宅・携帯・) | |
| ③ | | | (自宅・携帯・) | |

◎ドラベ症候群の特徴◎

- ❖ 乳幼児期に発症する難治てんかん（てんかん性脳症）
- ❖ 発作重積（てんかん発作が 5 分以上継続すること）や群発（短時間に発作を繰り返す）となることが度々ある
- ❖ てんかん発作には色々な型があり、個人や年齢により様々なタイプの発作が起こる
- ❖ 体温の上昇、光やある種の模様などによって発作が誘発される場合がある
- ❖ 汗をかきにくいため熱がこもりやすく体温が上昇しやすい
- ❖ 歩行時のふらつきやぎこちなさが目立つ
- ❖ 重度～軽度の知的障害や広汎性発達障害を伴うことが多い

かかりつけ病院

(主に内服薬の調整をする病院)

病院名:

TEL :

主治医: 科
先生

ID :



◎ 発作の種類 ◎

※該当項目には✓がついてます

| 発作有無 | 発作型 | 発作の説明 <u>チアノーゼ</u> : 血液中の酸素が不足し皮膚や唇、爪の先が青紫色になる症状 | 発作誘発因子 | 発作時対応方法 ・注意事項 |
|------|----------|--|--|--|
| □ | 強直発作 | 全身に力が入り、突っ張り、身体が固くなる発作。 <u>チアノーゼを伴うことがある。</u> | ピーン  | <input type="checkbox"/> 発熱 <input type="checkbox"/> 暑さ・温度差 <input type="checkbox"/> 光 <input type="checkbox"/> 模様 <input type="checkbox"/> 睡眠不足 <input type="checkbox"/> () |
| □ | 間代発作 | 全身、もしくは身体の一部が、ピクピクがくがくする発作。 <u>チアノーゼを伴うことがある。</u> | ピク ピクッ  | <input type="checkbox"/> 発熱 <input type="checkbox"/> 暑さ・温度差 <input type="checkbox"/> 光 <input type="checkbox"/> 模様 <input type="checkbox"/> 睡眠不足 <input type="checkbox"/> () |
| □ | 強直間代発作 | 全身を突っ張り、がくがくする発作。 <u>チアノーゼを伴うことがある。</u> | ピーン ↔ ピク ピクッ  | <input type="checkbox"/> 発熱 <input type="checkbox"/> 暑さ・温度差 <input type="checkbox"/> 光 <input type="checkbox"/> 模様 <input type="checkbox"/> 睡眠不足 <input type="checkbox"/> () |
| □ | 非定型欠神発作 | 意識を失いぼーっとする。話しかけても反応しない発作。目をパチパチする。 | ポー  | <input type="checkbox"/> 発熱 <input type="checkbox"/> 暑さ・温度差 <input type="checkbox"/> 光 <input type="checkbox"/> 模様 <input type="checkbox"/> 睡眠不足 <input type="checkbox"/> () |
| □ | ミオクロニー発作 | 全身、あるいは手足の一部が一瞬ピクッとする発作 | ピクッ ピクッ  | <input type="checkbox"/> 発熱 <input type="checkbox"/> 暑さ・温度差 <input type="checkbox"/> 光 <input type="checkbox"/> 模様 <input type="checkbox"/> 睡眠不足 <input type="checkbox"/> () |
| □ | 複雑部分発作 | 反応が低下し、顔色が悪くなったり、眼球が左右どちらかに寄ったり、身体の一部が無意識に動いたりする発作 | ポー  | <input type="checkbox"/> 発熱 <input type="checkbox"/> 暑さ・温度差 <input type="checkbox"/> 光 <input type="checkbox"/> 模様 <input type="checkbox"/> 睡眠不足 <input type="checkbox"/> () |

◎ 発熱時の対応 ◎



_____°C以上で対応



◎ 発作誘発の対策 ◎ - 詳細 -

発熱 

暑さや温度差  ※汗をかけないので体温調節ができない

光過敏 (光で発作を誘発) 

模様過敏 (模様で発作を誘発)  模様の詳細 等

睡眠不足 

その他

◎ 坐薬等の管理・使用について ◎

薬品名: ① / ②

使用量: ① mg · cc / ② mg · cc

保管場所: 冷暗所 · 常温

【

】

坐薬等使用の確認

- 保護者確認の上使用
- 保護者の確認が取れなくても使用
- 主治医の指示書通りの対応

坐薬等使用後の様子や状態

[]




◎ 坐薬等の使用方法 ◎



* 坐薬挿入時間を確認・記録して下さい

①横に寝かせ、顔を左右どちらかに向ける

②坐薬を肛門に入れた後は、薬がでないようにしばらく肛門を押さえておく



◎ 内服薬 ◎



体重 _____ Kg

| 薬 | 1日量(mg) | 回数(食後) | 不均等処方 |
|---|---------|--------|-------|
| | | 朝・昼・夕 | |

《服薬方法》



◎活動中に注意すること◎

□ 屋内活動（教室・体育館での体育授業等） 模様や光の対策、クーリングの有無 等



□ 屋外活動（外遊び・運動場での体育授業等） 暑い日のクーリング対策や外遊びの可否 等



□ 行事活動（運動会・プール・遠足・校外学習等） 暑い日のクーリング対策 等



□ 給食・おやつ アレルギー：有()・無／カフェイン（緑茶・チョコレート）摂取：可・否

□ 昼寝中・後

□ その他

◎発達・身辺自立・生活◎

☆発達運動 ずり這い・はいはい・伝い歩き・1人歩き・走る・ジャンプ・片足立ち・階段の昇降 等

言語 嘸語・単語・二語文・物の名前を見て言う／要求の理解・指示の理解や実行・色や数の認識 等

社会 声かけへの反応・人見知り・身振りの真似・「ごっこ」・人（同年代や大人）とのかかわり 等

認知 物を掴む・蓋の開け閉め・積木を真似して積む・○や+を描く 等

☆身辺自立食事：形態：授乳中・粉ミルク・離乳食（ペースト・刻み・一口大）・幼児食

自立：全介助・一部介助・1人で可
偏食の有無・内容 等

着替え：着衣：全介助・一部介助・1人で可 脱衣：全介助・一部介助・1人で可



排泄：排尿：全介助・一部介助・1人で可 排便：全介助・一部介助・1人で可



（おむつ・トレーニングパンツ・パンツ）

☆好きな遊び []

☆得意なこと []

☆苦手なこと・物 []

★こだわること・物 []

★こだわりへの対応 []

★パニックになること・物 []

★パニック時の対応 []

◎ その他 ◎