

# 救急搬送カード

【裏面あり】

ふりがな

名前

生年 月 日 生 体重  
S・H・R 年 月 日 生 体重  
(西暦) (年) (月) (日) (歳) Kg

住所

電話番号 — —

連絡先(保護者氏名・電話番号)

続柄

病名：ドラベ症候群(難治性てんかん)

熱性けいれんではありません。

てんかん発作が止まらず、命を落とす難病です。

**一刻も早く搬送をお願いします！**

特記事項(既往・アレルギー等)

内服薬

搬送先病院

主治医

電話番号 — —

診察券番号(ID)

発作開始時間

年 月 日 午前・午後

時 分

体温(腋窩)

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ °C ( \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分 計測)

発作時使用薬剤

午前・午後

時 分

- ダイアップ坐薬 【4・6・10】mg  
 エスクレ 注腸液・坐薬 【 \_\_\_\_\_ 】mg / cc  
 ブコラム 口腔用液【0.5・1・1.5・2】cc  
 \_\_\_\_\_ (ミダゾラム5mg/cc)

発作型

右優位・左優位・左右差なし / 眼球偏位:右・左・上

- 強直発作       間代発作       強直間代発作  
 複雑部分発作       欠神発作

発症から救急要請までの経過

(発熱:いつから / 発作:いつ・●分・●回 等)

重積時【病院内】使用薬剤(以前使用し鎮痙効果のあった薬剤)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ジアゼパム    セルシン         | <input type="checkbox"/> レベチラセタム    イーケプラ   |
| <input type="checkbox"/> ロラゼパム    ロラピタ         | <input type="checkbox"/> チオペンタール    ラポナール   |
| <input type="checkbox"/> ミダゾラム    ミダフレッサ       | <input type="checkbox"/> チアミラール    イソゾール    |
| <input type="checkbox"/> フェノバルビタール*<br>ノーベルパール | <input type="checkbox"/> ホスフェニトイン*<br>ホストイン |
- \*:ドラベ症候群では使用は要注意

主治医 特記事項

疾患概要 **ドラベ症候群**

 **Dravet Syndrome JP**  
ドラベ症候群患者家族会

2~4万人に1人の希少難治性てんかん。発熱や体温上昇でてんかん発作を誘発しやすい。重積発作(痙攣が5分以上続く、短時間に痙攣を繰り返す)をおこしやすく、重積の時間が長くなる事で脳症、後遺症のリスクが高くなる。いかに早く発作を止めるかが重要。ホストイン®、アレビアチン®の使用は増悪する可能性もあり慎重に。